**SASARAN
KESELAMATAN PASIEN
TIM KPRS**

1 **PATIENT
SAFETY
FIRST**

SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Ketepatan Identifikasi Pasien

Peningkatan Komunikasi Yang Efektif

Peningkatan Keamanan Obat yang perlu diwaspadai

Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi

Pengurangan Resiko Infeksi terkait Pelayanan Kesehatan

Pengurangan Resiko Pasien Jatuh

MENGIDENTIFIKASI PASIEN DENGAN BENAR

Rumah sakit mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki / meningkatkan ketelitian identifikasi pasien.

Tujuan

1. Untuk mencegah tertukarnya pasien
2. Untuk mencegah tertukarnya obat, tindakan dan pemberian maupun pengambilan specimen
3. Untuk mempermudah memberikan pelayanan diruang perawatan
4. Untuk memberikan keamanan pada pasien

Prosedur identifikasi dilakukan sebelum :
11 MOMENT/CODETPPTESKOM

1. Menerima Cairan intravena
2. Pemberian Obat-obatan.
3. Pemberian Diet
4. Transfusi darah.
5. Pemeriksaan radiologi.
6. Pembedahan dan prosedur invasif lainnya.
7. Transfer pasien.
8. Electroconvulsive Therapy (ECT)
9. Pengambilan Specimen.
10. Konfirmasi kematian.
11. Identifikasi terhadap pasien koma

Proses identifikasi paling sedikit menggunakan 2 dari 3 bentuk identitas, yaitu

Nama Pasien (sesuai KTP)

Tanggal Lahir Pasien

Nomer Rekam Medis

Bandingkan dengan gelang pasien

* Gelang identifikasi

Biru

- Laki-laki

Pink

- Perempuan

PPA menjelaskan prosedur pemasangan stiker penanda risiko di gelang identitas dan tujuannya kpd pasien/keluarga

Merah

Alergi

Kuning

Resiko jatuh

Ungu

Jangan Diresusitasi

Putih

Resiko psikiatri

INFORMASI APA SAJA YANG HARUS DIBERIKAN SAAT PEMASANGAN GELANG

- Jelaskan manfaat pemasangan gelang identifikasi
- Jelaskan bahaya yang menolak, melepas, menutupi gelang identifikasi
- Pesankan kepada pasien bahwa untuk mengingatkan petugas untuk mengecek gelang, sebelum petugas tersebut akan melakukan tindakan atau memberikan pengobatan

- Untuk pasien tidak sadar / tidak beridentitas / jiwa / mengalami keterbatasan lainnya maka identitas dapat dilakukan dengan mencocokkan gelang identifikasi dan foto yang ada di emr
- Gelang pasien dipasang ditangan, jika tidak dikaki, jika tidak di baju,
- Jika gelang terlepas dipasang kembali
- Jangan melakukan tindakan apapun jika pasien tidak mengenakan gelang
- Gelang pasien hanya dilepas saat pasien pulang.
- Pasien dengan disabilitas (anak-anak, lansia, bisu tuli, tidak sadar, gangguan jiwa) yang ditanya adalah penanggung jawab pasien.
- Pemasangan gelang identitas untuk pasien dengan ketiadaan ekstremitas dipasang di ekstremitas yang ada atau ketiadaan ekstremitas disemua bagian tubuh maka dipasang di berkas rekam medis dan tempat tidur pasien.

Verbal dan Visual

Pertemuan pertama

1. Berikan pertanyaan terbuka menanyakan nama lengkap dan tanggal lahir
2. Saat pasien menyebutkan nama dan tanggal lahir cocokan dengan gelang identitas pasien

Visual

Pertemuan selanjutnya

Berikan pertanyaan tertutupp nama pasien sambil dicocokkan dengan gelang identitas pasien

MENINGKATKAN KOMUNIKASI YANG EFEKTIF

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi lisan dan/atau telepon diantara para PPA, pelaporan hasil kritis dan serah terima

Tujuan

Membangun hubungan yang sinergis, dokter-dokter, dokter- perawat, perawat-perawat, perawat-team kesehatan lain, Profesi Pemberi Asuhan dengan personal atau institusi di luar Rumah Sakit,serta menurunkan resiko pelayanan medis yg merugikan.

Komunikasi antar PPA

- Komunikasi verbal dg read back, write down. Confirmation / TBaK (Tulis, Baca ulang, Konfirmasi)
- Melaporkan kondisi pasien dg SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)
- Adanya daftar singkatan
- Bila perlu di eja (alfabet phonetic)

Cara Komunikasi Lewat telepon

pelapor menuliskan dlm rekam medis dalam bentuk SBAR dan melaporkan dengan tehnik ISBAR (I : introduction)

Tulis lengkap di eMR

Konfirmasi
Pemberi instruksi harus memerikan konfirmasi/ verifikasi di eMR dalam waktu 1x24 jam

Baca Ulang / readback
(obat LASA dieja dg Alphabet Phonetic)

- Sesuai dengan kesepakatan internasional, dalam komunikasi lisan yang mempergunakan kata-kata sulit harus dilakukan konfirmasi informasi dengan menggunakan kode *phonetic alphabet*
- Baca ulang dengan jelas, bila perintah mengandung nama obat LASA, maka nama obat LASA harus dieja satu persatu hurufnya dengan fonetik alfabet
- Konfirmasi lisan dan tertulis, konfirmasi lisan sesaat setelah pemberi perintah mendengar pembacaan dan memberikan pernyataan kebenaran pembacaan secara lisan misal “ya sudah benar”.
- konfirmasi tertulis dengan tanda tangan pemberi perintah (verifikasi di emr) yang harus diminta pada kesempatan kunjungan berikutnya.
- **Ada kolom keterangan yang dapat dipakai mencatat hal-hal yang perlu dicatat, misal pemberi perintah tak mau tanda tangan.**

Monitoring Assessment CPPT Obsgin Bedah Resep Penunjang Diagnosa Resume Form Lain Upload Rekap						
CPPT						
Input CPPT		Konsultasi				
			- Konsul fisioterapi >>> sdh telp dr. Shery - kontrol TD sesuai TS neuro, th lain sesuai TS jiwa dr. Adam Sp An - nebulizer combivent + flixotid 6 jam (24,06,12,18) - NIV jika RR > 35 atau SpO2 <92%			
02-09-2022 13:27:44	CPPT	Inadekuat asupan berkaitan gangguan kesadaran	Ditl makanan cair 1500 kal, Frek 6x200 cc, kolaborasi dg perawat utk pemberian ditl via NGT, monitoring asupan	Arliana Prastyowati, AMG	dr. Kristin Kartika Ayu Setiawati, Sp.PD 03-09-2022 03:18	edit
02-09-2022 08:39:09	SBAR	sepsis ec pneumonia F06.1 HT on th post stoke	mohon konsul dan chest fisioterapi pada pasien iso. atas bantuan dan perhatiannya BTK	dr. Kristin Kartika Ayu Setiawati, Sp.PD	dr. Kristin Kartika Ayu Setiawati, Sp.PD 03-09-2022 03:18	edit jawab konsul
02-09-2022 08:31:02	CPPT	Sepsis ec pneumonia Pneumonia dengan ARDS HT on th/ post stroke	O2 adekuat sesuai TS anestesi ivfd asering aminofluid 20 tpm iv levofloxacin 1x750 mg iv h3 omz 1x40 mg iv restar 2x1250 mg iv nebu combivent flixotid 1.1 (8 jam) parasetamol 3x500 mg po kpl dexametason 3x5 mg iv	dr. Kristin Kartika Ayu Setiawati, Sp.PD	dr. Kristin Kartika Ayu Setiawati, Sp.PD 03-09-2022 03:18	edit

Monitoring Assessment CPPT Obsgin Bedah Resep Penunjang Diagnosa Resume Form Lain Upload Rekap						
CPPT						
Input CPPT		Konsultasi				
09:38:46		2 Hipokalemia	Saran: pertimbangkan koreksi kadar kalium darah dengan dosis 10 meq/ 2 jam dan periksa ulang kadar kalium setelah pemberian KCL		Putrinaria, Sp.JP 01-09-2022 00:43	
31-08-2022 09:25:00	CPPT	1)ADHF et.AS severe, MIR moderate PHI e z RHD 2) Hipoalbuminemia BAcienial infection (perbaikan) 3) Hipokalemia berat. 4) HipoIlg 5) HipoAb 6) AU block 2.1	1) Furosemide tunda sampai Kalium batas normal 2) Spironolacton dapat dinaikkan 50 mg po 3) Cek Magnesium hari ini >> Koreksi MgSO4 2 gram iv bolus pelan / sp 4) + PMP 2 X 250 mg po 5) EKG hari ini 6) Koreksi Kalium sudah dengan DR.JP IPD	dr. Agnes Dinar Putrinaria, Sp.JP	dr. Agnes Dinar Putrinaria, Sp.JP 01-09-2022 00:43	edit
31-08-2022 07:45:37	SBAR	ketidakseimbangan elektrolit	adakah tambahan koreksi elektrolit?	Erdang Fulfaningsih, S.Kep	dr. Agnes Dinar Putrinaria, Sp.JP 01-09-2022 00:43	edit jawab konsul
30-08-2022 22:40:36	CPPT	pola nafas in efektif hipovolemia nyeri akut	Kamar A2 -> H7 monitor kudan vs, kaji pola nafas atur posisi semi fowler, batasi cairan ben terapi sesuai advise Advise dr. Fatnan, SpPD: Inf asering 12 tpm Inj furosemid 1 amp (8 jam (jam 08-16-24) ganti SP 2.5mg (jam Inj lansoprazole 1 amp/24 jam (jam 08:00) Inj ceftriaxon 2g/24 jam mulai tgl 26/8/22 (jam 08:00) H 6 Sp Vascon 0.1 mcg/kg/ment -> turun 0,05 mcg/kg/ment STOP SP furosemid 2.5mg/jam SP vascon ganti dobutamin 5 mcg/kg/ment	Eko Legowo, AMK	dr. Fatnan Setyo Hariwibowo, Sp.PD 30-08-2022 22:23	edit

Komunikasi saat Handover

Komunikasi menggunakan data S O A
P dalam rekam medik dan saat
komunikasi menggunakan tehnik S B A
R

S : Situation

B : Background

A : Asesment

R : Rekomendation

PPA mencatat serah terima di form
handover kemudian dibubuhi tanda
tangan kedua belah pihak

SEBELUM SERAH TERIMA PASIEN :

1. Dapatkan pengkajian kondisi pasien terkini
2. Kumpulkan data yg diperlukan yg berhubungan dg kondisi pasien yg akan dilaporkan
3. Pastikan diagnosa medis pasien dan prioritas masalah keper. Yg harus dilanjutkan
4. Baca dan pahami catatan perkembangan terkini dan hasil pengkajian perawat shift sebelumnya
5. Siapkan emr pasien termasuk rencana perawatan harian

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

LAPORAN HARIAN BANGSAL
HARI / TANGGAL : 29/08/22

PASIEN	JML ANAK	MADUK			KELUAR			JML	JUMLAH BERURUT KLAS										JUMLAH AKHIR			
		BARU	PINDAHAN	PINDAH	PULANG	MATI	LARI		CASH													
PAGI	7		1		1			7	VP	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
SORE										1				2	4							
MALAM																						7

KONDISI PASIEN / TINDAKAN PERAWAT (Singkat & Jelas)

361

SDM: 1SDM cuti besar, 1IHT, 2manajemen dari Nst
 sarana prasarana = kunci lengkap. komputer Lemod.
 pelayanan M: 2 PC: 1 TC: 4
 Sari Puspita Handayani / 118498/118925 / mrs 5/9 22
 PN 1 SP: 1AB11, RMP(4) RKF(5) RED(5) RTL: OBSV KU, RESIKO
 m2 lodaok diaz/12g
 1 HS: 1AB11 → RTL: OBSV KU, lakukan Intv.
 2 SF: tenang → RTL: " "
 pulang Wasiatun/216060/110356/mrs 29/8 22
 PN 2 EP: 1AB11, RED(24) RKF(1) RTL: OBSV KU, RESIKO
 pengawakan m2 oem, besar ECT KR- 2
 3 MP: 1AB11, pasif infu 100g RTL: OBSV KU, lakukan Intv. motivasi kdm
 4 SP: tenang RTL: OBSV KU, lakukan Intv
 5 AS: tenang RTL: " "
 pasien pasien pasien
 Sufyani Siti Faridah utik.p

DINAS PAGI
1 Rochmala
2 WindaRT
3 Harbiyah
4 Nurichaya
5 utik.p

DINAS SORE
1
2

DINAS MALAM
1
2

LEPAS / LIBUR

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
UMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
 Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
 Telepon (0293) 353601, Faksimile (0293) 365183
 Website : www.soerojohospital.co.id Email : admin@soerojohospital.co.id

FORM HAND OVER ANTAR BAGIAN

Hari/Tanggal	Jam	Nama Pasien	No RM	Kondisi Pasien	Penyerah (nama Bagian dan Petugas)	Penerima (nama Bagian dan Petugas)
Rabu 24/08/2022	19.45	Suryati	231738	Napas: elapsirasi diperparang pro: Ro Thorax	Asim W. Shinta	Siti Ichotijah Radiologi
Selasa 23/08/22	08.30	Lius Subono	1789	Impulsif, fibrilasi ventrikel (ECT)	Rina W. Sumart	Siti Ichotijah Radiologi
Rabu 24/08/22	08.00	Lius Subono	1789	Impulsif, fibrilasi ventrikel (ECT)	Rina W. Sumart	Siti Ichotijah Radiologi
Kamis 25/08/22	08.15	Lius Subono	1789	Impulsif, fibrilasi ventrikel (ECT)	Rina W. Sumart	Siti Ichotijah Radiologi
Jumat 26/08/22	11.30	Suratinal	199289	Baham: keluar Dilake.	Siti Ichotijah Radiologi	Siti Ichotijah Radiologi

FORM HAND OVER ANTAR BAGIAN

Hari/Tanggal	Jam	Nama Pasien	No RM	Kondisi Pasien	Penyerah (nama Bagian dan Petugas)	Penerima (nama Bagian dan Petugas)	TTD Pasien/kg
29/8/2022	J 07.30	Taryadi		kooperatif			Yah
"		Joko Rahmad		kooperatif			Yah
"		Anas		kooperatif			Anas
"		Haxnudin		kooperatif	enrich	A. Syahid	
"		Domans		kooperatif			
"		Diantoro		kooperatif			Zau
"		Mul. Toyo		kooperatif			Jk
"		Pardanto		kooperatif			Jk
"		Mul. Apr		kooperatif	enrich	A. Syahid	Jk
"		Almad H		kooperatif			A

MENINGKATKAN KEAMANAN OBAT OBATAN YANG HARUS DIWASPADAI

Rumah sakit menerapkan proses untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi (high alert medication) termasuk obat termasuk obat LASA dan elektrolit konsentrat

No	Kelas Obat	Cara penyimpanan	Lokasi penyimpanan
1.	<p>NO. 1 / LASA</p>	disimpan terpisah tidak berdampingan serta diberi label warna kuning dengan tulisan LASA warna Hitam ,	Diseluruh unit pelayanan dan gudang farmasi
2.	<p>Obat dengan resiko tinggi</p>	<p>a. Obat <i>High Alert</i> harus disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, dalam almari atau rak tersendiri diberikan list warna merah, diberikan label bertuliskan <i>high alert</i> pada box dan setiap kemasan terkecil.</p> <p>b. Narkotika disimpan dalam almari terbuat dari kayu atau bahan yang kuat, dengan dua pintu dan berkunci <i>double</i>, kunci dipegang oleh dua orang berbeda dengan cara kunci dikalungkan. Adanya kartu stok masing-masing obat narkotika</p> <p>c. Psikotropika disimpan dalam almari terbuat dari kayu atau bahan yang kuat dengan pintu berkunci <i>double</i>, kunci dipegang oleh dua orang berbeda dengan cara kunci dikalungkan. Adanya kartu stok masing-masing obat psikotropika.</p>	<p>a. Instalasi farmasi dan emergency kit</p> <p>b. Instalasi farmasi</p> <p>c. Instalasi farmasi</p>
3.	Elektrolit konsentrat	disimpan di tempat terpisah, akses terbatas, dalam almari atau rak tersendiri diberikan list warna merah, diberikan label bertuliskan <i>high alert</i> pada box dan setiap kemasan terkecil. Serta berikan stiker tertulis “Diencerkan”.	Instalasi Farmasi dan didalam emergency kit yang terletak diruang ICU, sub instalasi kamar operasi, dan Ruang VK (ruang Bersalin),

Double cek : pengecekan yang dilakukan oleh dua orang petugas
Dan masing2 petugas membubuhkan paraf dilembar pemberian obat

Pemberian Obat *High Alert*

Not secure | 192.168.0.113:8006/home

HOME INSTALASI FARMASI LOG OUT

E-FARMASI - APOTEK RESEP | UNIT FARMASI : UGD - APOTEK -

PENYERAHAN OBAT

Tgl. Resep : 31-08-2022
dr. Kornelis Ibrawansyah, Sp. KJ. M.Sc. Bangsal Abimanyu

APT082200010932

OBAT / ALKES	JUMLAH DOSIS	OBAT / ALKES	JUMLAH DOSIS
DIAZEPAM 10MG INJ	6 1 Ampul Kp	VALDINEK INJ 10MG	6 AMPUL

TELAHAH RESEP

Persyaratan Administratif :
Nama dan Paraf Dokter (DR), Identitas Pasien (PX) Ya

Keesuaian Farmasetis :
Nama Obat (O), Dosis (D), Bentuk Sediaan (B), Rute (R), Lama Pemberian (L) Ya

Perimbangan Klinis :

Tepat Obat	Ya
Tepat Dosis	Ya
Tepat Rute	Ya
Tepat Waktu	Ya
Duplikasi	Tidak
Alergi	Tidak
Interaksi Obat	Tidak
Berat Badan Pasien (Kg)	60
Kontra Indikasi Lainnya	Tidak

Pengecekan :
High Alert Medicine (HAM) Ya

Pengecekan obat HAM dilakukan oleh :
Wahid Sabaan, M.Farm
Catur Wijanarko, A.Md

VERIFIKASI RESEP

Verifikator Telaah Resep
Wahid Sabaan, M.Farm
Sri Suryani

Entry Billing
Catur Wijanarko, A.Md

Pengisian Obat
Wahid Sabaan, M.Farm

Verifikator Penyerahan Obat

Tanda Tangan

dr. Kornelis Ibrawansyah, Sp. KJ. M.Sc.

double check farmasi dengan perawat pada saat penyerahan obat

Tanda Tangan Kembali

double check antara farmasi 1 dan farmasi 2 pada saat mengerjakan resep

Type here to search 30°C Berawan 15:26 12.09.2022

Perawat membubuhkan paraf pada saat serah terima / pengambilan obat HAM

High alert Medications

LOOK A LIKE

Memastikan sisi yang benar, prosedur yang benar, pasien yang benar pada pembedahan/ Tindakan invasif

Rumah sakit menetapkan proses untuk melaksanakan **verifikasi pra operasi**, **penandaan lokasi** operasi dan proses **time out** yg dilaksanakan sesaat sebelum Tindakan pembedahan/ invasive dimulai, serta proses **sign out** yang dilakukan setelah Tindakan selesai

MASALAH PEMBEDAHAN

- SALAH PASIEN
- SALAH LOKASI OPERASI
- SALAH PROSEDUR
- TERTINGGALNYA BENDA ASING DALAM TUBUH PASIEN

PROTOKOL PENCEGAHAN

1. penandaan (marking site)
lokasi operasi
2. fase sign in
3. fase time out
4. fase sign out

PENANDAAN LOKASI OPERASI

- * operasi **elektif** dilakukan **diruang rawat inap**
- * operasi **emergensi atau cito dan ODC** penandaan lokasi operasi dilakukan **diruang persiapan** pasien kamar operasi
- * Penandaan dilakukan oleh **DOKTER OPERATOR**, Disaksikan oleh perawat dan melibatkan keluarga pasien
- * Tanda yang digunakan berupa anak panah menggunakan sepidol warna HITAM (permanent) menunjuk lokasi operasi (tunggal atau multipel organ),kecuali utk bagian yg tidak dilakukan insisi (misal : curretage) dan tindakan utk gigi yg ditandai adalah gambaran rontgen.

Site Marking

Fase sign in

Fase sign In adalah fase sebelum induksi anestesi

koordinator secara verbal memeriksa :

- Identitas pasien
- Prosedur dan sisi operasi
- Tanda operasi
- Persetujuan untuk operasi telah diberikan

Koordinator dengan profesional anestesi mengkonfirmasi risiko pasien apakah pasien ada risiko kehilangan darah, kesulitan jalan nafas, reaksi alergi.

Time out

- **Fase Time Out** adalah fase setiap anggota tim operasi memperkenalkan diri dan peran masing-masing
- **Fase Time Out** dipimpin oleh **Dokter operator**

Fase sign out

Fase Sign Out adalah fase tim bedah akan meninjau operasi yang telah dilakukan.

Dilakukan pengecekan kelengkapan, seperti :

- **Spons**
 - **penghitungan instrumen**
 - **pemberian label pada spesimen**
- kerusakan alat atau masalah lain yang perlu ditangani**

Mengurangi resiko infeksi akibat perawatan kesehatan

Rumah sakit menerapkan kebersihan tangan (hand hygiene) untuk menurunkan resiko infeksi terkait layanan kesehatan

Cara transmisi dari infeksi yang paling sering adalah melalui tangan.

Membersihkan tangan adalah faktor terpenting didalam mencegah penyebaran patogen dan resistensi antibiotika

Angka kepatuhan yang diharapkan adalah 90 % (CDC – recommendations)

How to handrub? WITH ALCOHOL-BASED FORMULATION

Apply a palmful of the product in a cupped hand and cover all surfaces.

Rub hands palm to palm

right palm over left dorsum with interlaced fingers and vice versa

palm to palm with fingers interlaced

backs of fingers to opposing palms with fingers interlocked

rotational rubbing of left thumb clasped in right palm and vice versa

rotational rubbing, backwards and forwards with clasped fingers of right hand in left palm and vice versa

rinse hands with water

dry thoroughly with a single use towel

use towel to turn off faucet

20-30 sec

...once dry, your hands are safe.

40-60 sec

...and your hands are safe.

How to handwash? WITH SOAP AND WATER

Wet hands with water

apply enough soap to cover all hand surfaces.

WHEN? Your 5 moments for hand hygiene

Mengurangi resiko cedera pasien akibat jatuh

Rumah sakit menerapkan proses untuk mengurangi resiko

Melakukan pengkajian ulang secara berkala mengenai resiko pasien jatuh, termasuk resiko potensial yang berhubungan dengan jadwal pemberian obat serta mengambil tindakan untuk mengurangi semua resiko yang telah diidentifikasi tersebut.

Menurunkan resiko cedera karena jatuh

Asesmen resiko jatuh ->monitor sejak admision baik rawat inap maupun rawat jalan ->diulang bila ada perubahan kondisi pasien atau pengobatan.

Pasien **rawat inap**:

Penilaian risiko jatuh pada Pasien **Dewasa** dengan **Skala Jatuh Morse**

Penilaian risiko jatuh pada Pasien **Anak** dengan **Skala Humpty Dumpty**

Penilaian risiko jatuh pasien **Psikiatri** dengan **Skala Edmonson**

Penilaian risiko jatuh pada Pasien **Rawat jalan dan IGD** dengan **Get Up and Go Test**

Assesmen ulang dilakukan pada

- ✓ Pasien pasca operasi
- ✓ Pasien pasca sedasi
- ✓ Pasien pasca tindakan invasif risiko tinggi
- ✓ Penambahan obat-obat sedatif (kecuali pasien ICU yang menggunakan sedasi dan paralisis), Hipnotik, Barbiturat, Fenotiazin, Antidepresan, Laksans/ Diuretika, Narkotik.
- ✓ Pemberian Obat-obat berisiko tinggi (diuretik, narkotik, sedatif, anti psikotik, laksatif, vasodilator, antiaritmia, antihipertensi, obat hipoglikemik, antidepresan, neuroleptik, NSAID, Hipnotik, Barbiturat, Fenotiazin).
- ✓ Penurunan kesadaran.
- ✓ Pasien pasca jatuh.
- ✓ Pasien pindah dari bangsal lain
- ✓ Pasien yang tidak makan minum > 3 hari

ASSESMEN RESIKO JATUH

PENGKAJIAN FUNGSIONAL

Alat Bantu:

Prothesa:

Cacat Tubuh:

ADL:

Dibantu Total:

RESIKO JATUH (GET UP AND GO TEST)

1. Perhatikan cara berjalan pasien saat akan duduk di kursi. Apakah Pasien tampak tidak seimbang (Sempoyongan/Limbung) ?

Ya

Tidak

2. Apakah Pasien memegang pinggir kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat akan duduk? ?

Ya

Tidak

Hasil:

RIWAYAT ALERGI

BAHAN REAKSI + Alergi

RIWAYAT PENGGUNAAN OBAT

OBAT	DIBAWA	JUMLAH	+

PSIKO, SOSIO, SPIRITUAL, EKONOMI

Psikososial

- Kecemasan
- Perasaan rendah diri
- Kesulitan komunikasi
- Kesulitan bernail

MSN Indonesia | Berita Terkini | E-MEDICINE

Not secure | 192.168.0.113:8006/emr

Cetak Berkas

Summary List

Tgl. Peniksa: 26-08-2022
 Klinik: IGD
 PPA: dr. Muhammad Himawan Baihaqi
 Diagnosa: -
 Terapi: -

Get IP: 22a88387-0fce-4437-86fb-876aa4bddd190.local

RENCANA / INTERVENSI KEPERAWATAN

☒ Monitoring tanda vital	☐ Manajemen Airway	☐ Manajemen Asam Basa
☐ Promosi perfusi jaringan serebral	☐ Manajemen nyeri	☐ Manajemen shock
☒ Pendidikan Kesehatan	☒ Melaksanakan program terapi	

LAINYA:

IMPLEMENTASI

TGL	JAM	TINDAKAN KEPERAWATAN	PELAKSANA
2022-08-26	17:47	MONITOR VS	Dwi Aringgun Prabandari ANK
2022-08-26	18:00	SCREENING RESIKO JATUH	Dwi Aringgun Prabandari ANK
2022-08-26	18:00	INTERVENSI RESIKO JATUH	Dwi Aringgun Prabandari ANK

TINDAKAN PERAWAT

+ TINDAKAN

EVALUASI

Tanggal	Jam	Subject	Object	Assessment	Plan	Pelaksana
2022-08-26	17:50	-	PATEN JALAN NAFAS	Masalah teratasi	PINDAH KE RUANG BASUKARNA	Dwi Aringgun Prabi

Simpan

PENGGKAJIAN RESIKO JATUH RAWAT INAP

Humpty Dumpty

- Anak usia 0-18 tahun
- Score 7-11 (**Risiko Rendah**), dinilai ulang resiko jatuhnya setiap 1 hari
- Score 12 - 23 (**Risiko Tinggi**), intervensi dilakukan tiap 4 jam dan pengkajian diulang setiap shift
- Anak 0-12 tahun dikategorikan **Risiko Jatuh Tinggi (RT)**

Edmonson

- Pengkajian resiko jatuh dewasa dan lansia
- Score (0-24) **Risiko Rendah (RR)** dinilai ulang resiko jatuhnya setiap 1 hari
- Score (25-50) **Risiko Sedang (RS)** intervensi setiap shift jaga dan dinilai ulang setiap shift
- Score (> 50) **Risiko Tinggi (RT)** intervensi 4 jam dan dinilai ulang setiap shift

Morse

- Pada pasien psikiatri
- Score (< 90) **Tidak Berisiko Jatuh (TR)** dinilai ulang tiap hari
- Score (≥ 90) **Berisiko Jatuh Tinggi (RT)** intervensi tiap 4 jam dan dinilai ulang tiap shift

PROSEDUR GET UP AND GO TEST

Dilakukan di rawat jalan dan IGD

- ✘ Perhatikan cara berjalan pasien saat akan duduk di kursi. Apakah pasien tampak tidak seimbang (sempoyongan/limbung) (ya/ tidak)
- ✘ Apakah pasien memegang pinggiran kursi atau meja atau benda lain sebagai penopang saat akan duduk? (ya/tidak)

1 ya : risiko rendah **→** **edukasi agar berhati -hati**

2 ya : risiko tinggi **→** **edukasi dan pasang pita warna kuning**

PENGAJIAN DAN INTERVENSI RESIKO JATUH PADA PASIEN GANGGUAN JIWA (EDMONSON)			Nama : No RM :		Tgl lahir : Instalasi : Ruangan :	
Parameter	Kriteria	Nilai Skor	Penilaian awal Tgl ...	Penilaian 2 Tgl...	Penilaian 3 Tgl...	Penilaian 4 Tgl...
Usia	< 50 th	8				
	50 – 79 th	10				
	>80 th	26				
Status Mental	Kesadaran/orientasi baik	-4				
	Ada kecemasan/agitasi	12				
	Kadang-kadang bingung	13				
	Confusion/disorientasi	14				
Pola BAB/BAK	Mampu mengontrol BAB/BAK dengan baik	8				
	Memakai dower cateter/ostony	12				
	BAB/BAK dibantu	10				
	Incontinensia, nocturia, frekuensi	12				
Pengobatan	Tidak memakai obat-obatan	10				
	Memakai obat-obatan jantung	10				
	Memakai obat antipsikotic termasuk benzodiazepin dan antidepresan	8				
	Atau pemakaian obat anestesi, nyeri dalam 24 jam terakhir	12				
Diagnosis	Gangguan bipolar/ skizoafektif	10				
	Penyalahgunaan alkohol/ zat lain	8				
	Gangguan depresi mayor	10				
	Gangguan dimensia/ delirium	12				
Ambulasi/ keseimbangan	Mobilisasi mandiri	7				
	Mobilisasi pakai alat bantu	8				
	Vertigo/ hipotensi orthostatik/ kelemahan anggota gerak	10				
	Tidak siap/ butuh bantuan dan kewaspadaan dalam kemampuan diri	8				
	Tidak siap atau lupa keterbatasan diri	15				

PENGKAJIAN DAN INTERVENSI RISIKO JATUH PASIEN ANAK (HUMPTY DUMPTY)		Nama :	Tgl lahir :
		No RM :	Instalasi :
			Ruangan :
Pengkajian risiko jatuh dilakukan saat pasien masuk, ketika terjadi perubahan kondisi, ketika pindah dari bangsal lain atau setelah kejadian jatuh			
PARAMETER	KRITERIA	TANGGAL WKTU	
Umur	Dibawah 3 tahun	4	
	3-7 tahun	3	
	8-13 tahun	2	
	>13 tahun	1	
Jenis Kelamin	Laki-laki	2	
	Perempuan	1	
Diagnosis	Kelainan neurologi	4	
	Perubahan dalam oksigenasi (masalah saluran nafas, dehidrasi, anemia, anoreksia, sinkop/sakit kepala dll)	3	
	Kelainan psikis/ perilaku	2	
	Diagnosa lain	1	
Gangguan koqnitif	Tidak sadar terhadap keterbatasan	3	
	Lupa keterbatasan	2	
	Mengetahui kemampuan diri	1	
Faktor lingkungan	Riwayat jatuh dari tempat tidur saat bayi – anak	4	
	Paasien menggunakan alat bantu atau box atau mebel	3	
	Pasien berada di tempat tidur	2	
	Di luar ruang rawat inap	1	
Respon terhadap operasi/ obat penenang / efek anestesi	Dalam 24 jam	3	
	Dalam 48 jam riwayat jatuh	2	
	>48 jam	1	
Penggunaan obat	Bermacam macam obat yang digunakan: obat sedatif (kecuali pasien ICU yang	3	

PENGKAJIAN DAN INTERVENSI PASIEN JATUH DEWASA (MORSE)		Nama :	Tgl lahir :
		No RM :	Instalasi :
			Ruangan :
Pengkajian risiko jatuh dilakukan saat pasien masuk, ketika perubahan kondisi, ketika pindah dari bangsal lain atau setelah kejadian jatuh			
Nilai resiko jatuh	Faktor resiko		Tanggal Waktu
	Riwayat jatuh	Kurang dari 3 bulan	25
	Kondisi kesehatan	Lebih dari satu diagnosa penyakit	15
	Bantuan ambulasi	Di tempat tidur/butuh bantuan perawat/memakai kursi roda	0
		Kruk, tongkat, walker	15
	Terapi IV/ antikoagulan	Furniture : dinding, meja, kursi, almari	30
		Terapi intravena terus menerus	20
	Gaya berjalan/ berpindah	Normal/ ditempat tidur/ imobilisasi	0
		Lemah	10
	Status mental	kerusakan	20
Orientasi dengan kemampuan sendiri		0	
Lupa keterbatasan		15	
TOTAL SKOR			
RR : Resiko rendah (0-24) RS : Resiko sedang (25-50)		RR/ RS/ RT	RR/ RS/ RT
RT : Resiko Tinggi (>51) (Lingkari)		RR/ RS/ RT	RR/ RS/ RT
Nama dan paraf yang melakukan pengkajian			
Interval pencegahan resiko jatuh		Tanggal waktu	
Resiko rendah (RR)	Orientasi lingkungan		
	Pastikan bel mudah dijangkau		
	Roda tempat tidur pastikan pada posisi terkunci		
	Posisikan tempat tidur pada posisi terendah		
	Naikan pagar pengaman tempat tidur		
	Pastikan lampu tidur hidup saat malam hari		
Resiko sedang (RS)	Berikan edukasi pasien		
	Lakukan semua pedoman pencegahan jatuh resiko rendah		
	Beri tanda segitiga warna kuning pada bed pasien, pintu atau RM pasien		
Beri tanda resiko jatuh pada gelang identitas yang menempel pada pasien			

PENGAJIAN RESIKO JATUH RAWAT INAP

Monitoring Assessment CPPT Obsgyn Resep Penunjang Diagnosa Resume Form Lain Rekap

CPPT

Input CPPT

Konsultasi

CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI

SUBJECTIVE

nyeri berkurang

OBJECTIVE

- RPD : pengobatan TB (Tuntas) + HT
- tidak ada alergi
- belum vaksin
- pengkajian ulang resiko jatuh morse sedang ringan (score 35) edukasi pasien , rendahkan dan kunci roda tempat tidur , pasang handrail , pastikan bel mmudah terjangkau , pasang stiker kuning segitiga resiko jatuh luka post op kering tidak rembes
cm tensi 123/69 nadi 66 suhu 36,3 rr 20 spo2 95 ra bak 2x minum 2 gelas

ASSESSMENT

nyeri akut
ggn integritas kulit

PLAN

stlh dilakukan tindakan kprwt 1x24jam tingkat nyeri berkurang skala nyeri berkurang skala nyeri 0/10

PENATALAKSANAAN RESIKO JATUH

<p>KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG</p>	Nomor SOP-AP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Direktur Utama dr. Rukmono Siswihanto, Sp. OG (K), M. Kes, MPH Nip. 196404111990101001
Nama SOP : PENANGANAN KEJADIAN PASIEN JATUH DENGAN ATAU TANPA CEDERA		
Dasar Hukum : 1.	Kualifikasi Pelaksanaan : pasien rawat inap dewasa dan lansia dilakukan oleh perawat atau bidan rawat inap	
Keterkaitan : PP PAP	Peralatan Perlengkapan : 1. Komputer ERM 2. Alat pemeriksaan (Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Lampu senter, Jam tangan)	
Peringatan : Jika SOP ini tidak dikerjakan akan menyebabkan insiden keselamatan pasien	Pencatatan dan pendataan : 1. Pelaporan Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	

PENANGANAN KEJADIAN PASIEN JATUH DENGAN ATAU TANPA CEDERA

NO	KEGIATAN	Perawat ranap	Kelengkapan	MUTU BAKU		KETERANGAN
				Waktu	Output	
1	menjelaskan tujuan dan langkah - langkah pengkajian resiko jatuh		Elektronik Rekam Medik, Alat pemeriksaan (Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Lampu senter, Jam tangan)	3 Menit	pasien siap di lakukan pengkajian resiko jatuh dan alat tersedia	petugas perawat atau bidan jaga ruangan rawat inap
2	Pelaksanaan a. Menyapkan alat b. Perawat atau bidan segera memeriksa kondisi pasien dan adanya cedera fisik pada pasien, gangguan kesadaran dan tanda-tanda vital. c. Dokter yang bertugas segera diberitahu untuk menentukan evaluasi lebih lanjut d. Pasien yang diperbolehkan turun dari tempat tidur harus ditemani petugas atau keluarga e. Pengasuh / keluarga yang menyaksikan atau yang menemukan kejadian pasien jatuh harus melaporkan kepada perawat atau bidan f. Kemudian perawat atau bidan melaporkan kejadian pasien jatuh melalui aplikasi SIMPATI (Sistem Pelaporan Pasien Safety) g. Apabila terjadi insiden jatuh yang diakibatkan karena kesalahan petugas rumah sakit atau sarana yang tidak memadai dan mengakibatkan cedera pada pasien, Rumah sakit bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan akibat insiden tersebut dengan persetujuan manajemen rumah sakit h. Pada pasien risiko tinggi, tempat tidur harus dalam posisi serendah mungkin. Tempat tidur hanya boleh ditinggikan saat pemeriksaan medis, penanganan keperawat atau bidanan atau saat transfer antar unit i. Pastikan pengaman tempat tidur selalu di tutup dan pegangan di sisi tempat tidur harus terpasang dengan baik. Kunci seluruh roda tempat tidur, kursi roda dan brancard dan inpengkajiansikan kepada pasien dan keluarga tentang tujuan penguncian roda tempat tidur tersebut j. Perawat atau bidan melakukan pengkajian ulang resiko jatuh sesuai kondisi setelah jatuh		Elektronik Rekam Medik, Alat pemeriksaan (Tensimeter, Stetoskop, Termometer, Lampu senter, Jam tangan)	10 Menit	Dokumen ERM Penanda resiko jatuh terpasang	perawat atau bidan melakukan penanganan pasien jatuh
3	melakukan dokumentasi dalam EMR		Elektronik Rekam Medik	2 menit	dokumentasi di ERM terisi lengkap pengkajian dan intervensi	dokumentasi dituliskan melalui EMR di CPPT pada kolom Obyektif

PENATALAKSANAAN RESIKO JATUH

Monitoring Assessment CPPT Obsgyn Resep Penunjang Diagnosa Resume Form Lain Rekap

CPPT

Input CPPT Konsultasi

PROSEDUR

+ Prosedur

TINDAKAN RS	PROSEDUR (ICD 9)	BUKTI / LAPORAN TINDAKAN	
Pemberian injeksi IM, IV, SC, IC *)	injection or infusion of therapeutic o prophylactic substance	* inj Ceftriaxone 1 gr/12 jam >> ST jam 20 (mulai tgl 22/08/22) selanjutnya jam 08.20 * inj Ketorolac 30 mg/8 jam >> jam 24, 08, 16 * inj Lansoprazole 30 mg/12 jam >> jam 08.20	[-]
Monitor VS		cm tensi 123/69 nadi 66 suhu 36,3 rr 20 spo2 95 ra	[-]
Pendidikan Kesehatan		edukasi pasien , rendahkan dan kunci roda tempat tidur , pasang handrail , pastikan bel mmudah terjangkau , pasang stiker kuning segitiga resiko jatuh	[-]
monitor infus		Infus RL 20 tpm	[-]

Simpan

PENGLKAJIAN ULANG

Monitoring Assessment CPPT Obsgyn Resep Penunjang Diagnosa Resume Form Lain Rekap

CPPT

Input CPPT Konsultasi

CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI

SUBJECTIVE	OBJECTIVE
lemes ngliyer mata kanan merah tidak bisa tidur batuk berkurang	dx BR PN cm tensi 108/67 nadi 82 suhu 36,3 rr 20 spo2 98 nra bak 4x minum 3 gelas pengkajian ulang resiko jatuh morse rendah score 20 implementasi resiko jatuh -mengorientasikan lingkungan -memastikan bel terjangkau -roda tmpt tidur posisi terkunci -menaikan pagar tmpt tidur -memastikan lampu menyala pada malam hari
ASSESSMENT	PLAN

SETIGITA PENANDA RISIKO JATUH
UNTUK BED

Kemenkes
RS Soerojo

THANK YOU