

VAKSINASI MENINGITIS

- **Lokasi penyuntikan :**
Vaksin meningitis bisa disuntikkan di paha atau lengan atas
- **Vaksin meningitis tidak boleh diberikan pada :**
 1. orang yang memiliki riwayat alergi terhadap vaksin meningitis,
 2. wanita hamil
 3. pasien yang mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh yang berat
- **Efek samping ringan** sesudah imunisasi antara lain nyeri atau kemerahan pada lokasi suntikan, demam ringan
- **Efek samping berat** sesudah imunisasi antara lain demam tinggi, lemah, lesu, perubahan perilaku, mual muntah, sesak napas
- **Pemberian sertifikat vaksin (ICV)** kepada penerima vaksin



Sesudah injeksi vaksin akan dilakukan observasi selama **30 menit** untuk melihat apakah ada reaksi alergi tipe cepat (muncul segera setelah pemberian vaksin)

RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang telah mempunyai layanan Vaksinasi Meningitis

Penanganan pertama efek samping vaksin
Untuk reaksi ringan bisa dilakukan kompres dingin pada area suntikan dan meminum obat anti nyeri yang dijual bebas (paracetamol atau ibuprofen)
Untuk reaksi berat harus konsultasi ke dokter

RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang memiliki tenaga ahli/ dokter ahli dalam hal menangani adanya reaksi yang terjadi dari vaksinasi.

INFORMASI DAN TATA CARA

PENDAFTARAN

VAKSINASI MENINGITIS

Dapat menghubungi:

INSTALASI PENILAIAN KAPASITAS MENTAL

RSJ PROF. DR. SOEROJO MAGELANG



Kenapa Harus VAKSIN MENINGITIS




Sebelum pergi Umroh, Haji,



RSJ Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jl. A. Yani No. 169 Magelang
Telpon (0293) 363601 Fax. (0293) 365183
website: www.soerojohospital.co.id
Email : admin@soerojohospital.co.id

MENINGITIS



Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang.

Penyakit meningitis disebabkan oleh berbagai virus, bakteri maupun jamur. Tetapi penyebab terbanyak adalah *Neisseria meningitidis* (meningokokus) terutama serogrup A,B,C,X,Y dan W-135

Gejala yang muncul diantaranya demam, sakit kepala hebat, fotofobia (takut/menghindari cahaya yang terang), mual dan muntah, perubahan status mental dan penurunan kesadaran

Penularan melalui percikan air ludah saat orang bicara, batuk atau bersin, atau kontak langsung misal dengan berciuman atau memakai alat makan bersama

PENCEGAHAN

- ⇒ Menghindari kontak dengan penderita,
- ⇒ Menggunakan masker,
- ⇒ Menjaga asupan gizi dengan baik,
- ⇒ Cuci tangan dengan sabun,
- ⇒ Imunisasi/ vaksinasi meningitis



VAKSINASI MENINGITIS

Salah satu cara untuk mencegah terjangkit infeksi meningitis yang disebabkan oleh meningokokus adalah dengan imunisasi meningitis

Sangat dianjurkan bagi para calon jamaah haji, umroh atau tenaga kerja Indonesia yang bertugas di Arab Saudi atau daerah endemis meningitis.

Imunisasi/ vaksinasi paling lambat diberikan 14 hari sebelum keberangkatan, karena kekebalan mulai terbentuk setelah 14 hari pasca imunisasi